



INTERNATIONAL
NASH DAY

NAFLD/NASH KOD DJECE

Što je NAFLD/NASH?

Nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD)

NAFLD, nealkoholna masna bolest jetre, stanje je u kojem dolazi do stvaranja prekomjernih masnih naslaga u jetri. Kada se ne liječi može uzrokovati ozbiljne probleme s jetrom.

Nealkoholni steatohepatitis (NASH)

NASH nastaje kada se zbog prekomjerne masnoće stvori upala (otjecanje u jetri) te fibroza (ranice) u jetri. U težim slučajevima zbog ovoga može doći do ciroze ili raka jetre.

Koja djeca imaju rizik od NAFLD/NASH-a?

Pretila djeca imaju najveći rizik od nastanka dječjeg NAFLD-a i NASH-a. Ostali čimbenici kao što su dijabetes tipa 2, inzulinska rezistancija, metabolički sindrom ili visok kolesterol također mogu povećati rizik kod djeteta.

Dječji NAFLD i NASH učestaliji su kod starije djece nego kod mlađe te su češći kod dječaka nego kod curica. Među djecom koja imaju dječji NAFLD, curice i dječaci pod jednakim su rizikom od NASH-a.

Premda se NAFLD/NASH može javiti u svim etničkim skupinama, učestaliji su kod djece španjolskog i azijskog podrijetla te bijele djece nego kod djece afričkog podrijetla. Daljnjiim istraživanjem utvrđeno je da španjolska djeca meksičkog podrijetla imaju jednu od najvećih stopa pojavnosti NAFLD-a.



Dječiji NAFLD najčešći je uzročnik bolesti jetre kod djece u Sjedinjenim Američkim Državama

Znanstvenici procjenjuju kako do 10% američke djece dobi od 2 do 18 godina ima masnu jetru



Pretila djeca imaju najveći rizik od nastanka NAFLD-a and NASH-a

Diljem svijeta,
41 milijun

djece
dobi do 5 godina
ima prekomjernu
težinu ili su pretila

Više od 340 milijuna djece
i mlađih dobi 5–18 godina ima
prekomjernu težinu ili su pretila

Nastavi li se ovakva tendencija,
više će djece i mlađih biti pretilo
nego pothranjeno do 2022.,
prema podacima Imperijalnog koledža u
Londonu i Svjetske zdravstvene organizacije.



Koje znakove i simptome djeca ispoljavaju?

Mnoga djeca ne ispoljavaju simptome u ranim fazama. Kada dođe do uznapredovalog oštećenja jetre, znakovi dječjeg NAFLD/NASH-a postaju jasniji.

Djeca prijavljuju:

- Umor i iscrpljenost
- Promjene u boji kože
- Bol u trbuhu

Ciroza je uznapredovala bolest jetre te može nastati kao posljedica NASH-a. Ukoliko nastupi kod djece, mogu se javiti sljedeći simptomi:

- Žutica (žutilo kože i bjeloočnice)
- Svrbež kože
- Oticanje trbuha
- Tamni urin



Kako se dijagnosticira dječji NAFLD/NASH?

Masna jetra i dječji NASH mogu imati vrlo malo primjetnih simptoma u ranim fazama. Međutim postoji nekoliko pretraga za dijagnosticiranje NAFLD/NASH kod djece. U ove pretrage spadaju:

1 Opći pregled i anamneza

2 Krvna slika

3 Radiološka dijagnostika (npr. ultrazvuk, MR)

4 Biopsija jetre

Što mogu uraditi kad moje dijete dobije dijagnozu?

Trenutno nema odobrenih lijekova za NAFLD/NASH dječjeg doba. Međutim u ranim fazama moguće je sprječiti pojavu oštećenja jetre ili dječjeg NASH-a promjenom načina života s fokusom na tjelesnu aktivnost i adekvatnu prehranu.

Ukoliko se bolest ne liječi te jetra postane toliko oštećena da prestane raditi, kod djeteta može biti potrebno presađivanje jetre.



Kako se dječiji NAFLD/NASH može liječiti?

Količina masnoće u jetri može se smanjiti odgovarajućom prehranom, tjelesnom aktivnosti, održavanjem zdrave tjelesne težine i adekvatnim snom. Na ovaj način može se liječiti i spriječiti NAFLD i NASH kod djece.

Postavi ovo na svoj frižider kao podsjetnik



Prehrana

-  Zamijeni zašećerena i gazirana pića vodom ili niskokaloričnim napicima
-  Ne uzimaj slatkiše i šećer za zaslugu ili kao nagradu
-  Na nutritivnim tablicima pregledaj količinu skrivenih masnoća, šećera i natrija
-  Izbjegavaj prevelike porcije za djecu. Uzimi mali tanjur predviđen za djecu.
-  Cilj nek ti bude 5 porcija voća i povrća na dan
-  Drži se podalje od brze hrane i pržene hrane
-  Probaj ne jesti industrijski obrađenu hranu



Tjelesna aktivnost

-  Cilj nek ti bude 60 minuta tjelesne aktivnosti na dan. Ne mora to biti sve odjednom. Više hodaj, vježbaj, idi stubama kad god je moguće.
-  Dobar san je važan. Odredi pravilan raspored spavanja kako bi vaše dijete imalo dovoljno sna. Pitaj svog pedijatra koja količina sna je potrebna svake noći.
-  Smanji vrijeme provedeno ispred ekrana, na medijima i mobilnim uređajima. Izbjegavaj biti ispred ekrana dok jedeš, a navika boravka ispred ekrana ne smije ometati raspored spavanja i tjelesne aktivnosti.

Kako klinička ispitivanja mogu pomoći mom djetetu?

Klinička ispitivanja su istraživačke studije u kojima sudjeluju pacijenti svih dobi, a u njima se istražuju novi načini prevencije, prepoznavanja i liječenja bolesti, te poboljšanja kvalitete života. Istraživanja u kojima sudjeluju djeca pomažu znanstvenicima:

- utvrditi skrb koja je najbolja za dijete
- pronaći najbolju dozu lijeka
- pronaći terapiju za bolesti koje pogađaju djecu
- liječiti bolesti koje imaju drukčiji način ispoljavanja kod djece
- bolje razumjeti kako liječenje utječe na dječje tijelo u razvoju



INTERNATIONAL
NASH DAY | 

www.international-nash-day.com

#NASHday @globalliver



Info tel. 0800 400 405 | www.hepatos.hr



Globalni institut za bolesti jetre neprofitna je organizacija oslobođena poreza (501(c)(3)), sa sjedištem u Washingtonu u Sjedinjenim Američkim Državama. Naša misija je unapređenje učinkovitosti zajednice za zdravlje jetre promocijom inovacija, suradnje i procjene optimalnih pristupa suzbijanju iskorjenjivanju bolesti jetre. Međunarodni dan NASH-a i njegov logo registrirana je trgovinska marka Globalnog instituta za bolesti jetre.

Ovaj sadržaj ima za cilj pružiti korisne opće zdravstvene informacije široj populaciji. Ovaj sadržaj nije namijenjen za savjetovanje pojedinaca povodom individualnih zdravstvenih problema. Globalni institut za bolesti jetre, zajedno sa svojim čelnicima i djelatnicima, izričito se odriče svake odgovornosti za sigurnost, gubitak ili rizik, osobne ili druge naravi, koji može, izravno ili neizravno, nastupiti slijedom čitanja i primjene bilo kojeg dijela ovog sadržaja.

Izvori i literatura

Schwimmer JB, Deutsch R, Kahan T, Lavine JE, Stanley C, and Behling C. Prevalence of fatty liver in children and adolescents. *Pediatrics*. 2006; 118(4):1388-1393.

Chalasani N, Younossi Z, Lavine JE, et al. The diagnosis and management of non-alcoholic fatty liver disease: practice guidance from the American Association for the Study of Liver Diseases [published online July 2017]. *Hepatology*. Doi:10.1002/hep.29367.

Tenfold increase in childhood and adolescent obesity in four decades: new study by Imperial College London and WHO 11 October 2017 News Release LONDON- <http://www.who.int/news-room/detail/11-10-2017-tenfold-increase-in-childhood-and-adolescent-obesity-in-four-decades-new-study-by-imperial-college-london-and-who>.

NASPGHAN Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Treatment of Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Children: Recommendations from the Expert Committee on NAFLD and the North American Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition; Miriam B. Vos, et al.

Betancourt-Garcia M.M., Arguelles A., Montes J., Hernandez A., Singh M., Forse R.A. Pediatric Nonalcoholic Fatty Liver Disease: The Rise of a Lethal Disease among Mexican American Hispanic Children. *Obes. Surg.* 2017;1–9. doi: 10.1007/s11695-016-2440-5.

Symptoms & Causes of NAFLD & NASH in Children; National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases - <https://www.niddk.nih.gov/health-information/liver-disease/nafld-nash-children/symptoms-causes>

Just Enough for You: About Food Portions; National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases - <https://www.niddk.nih.gov/health-information/weight-management/just-enough-food-portions>

The 2018 Physical Activity Guidelines for Americans, Physical Activity Guidelines Advisory Committee, U.S. Department of Health and Human Services - https://health.gov/sites/default/files/2019-09/Physical_Activity_Guidelines_2nd_edition.pdf

Clinical Trials for NAFLD & NASH in Children, NIDDK, NIH <https://www.niddk.nih.gov/health-information/liver-disease/nafld-nash-children/clinical-trials>